

# ЛЕКЦІЯ III.

## Категорії ризику потенційного ураження працівників системи ЕМД

# Цілі

- 1. Пояснити окремі терміни**
- 2. Вивчити епідемічні ризики для працівників ЕМД**
- 3. Розглянути рекомендації, щодо зменшення  
можливого ризику зараження працівників ЕМД**
- 4. Розглянути управління персоналом**

# Терміни

# Аерозоль індукуючі маніпуляції (АІМ)

- 1. СЛР**
- 2. Відновлення прохідності дихальних шляхів**
- 3. Інтубація/екстубація**
- 4. Небулайзерна терапія**
- 5. ШВЛ**

# Активний моніторинг

- 1. Визначення наявності у працівників ознак ГРЗ та проведення термометрії до початку роботи**
- 2. Безпосередньо на робочому місці**
- 3. Опитування за допомогою телефонних дзвінків та іншими засобами**
- 4. Тривалість не менше 14 днів з моменту останнього контакту**

# Самоконтроль

- 1. Самостійна оцінка ознак ГРЗ + термометрія**
- 2. Тривалість не менше 14 днів з моменту останнього контакту**

# Тісний контакт

- 1. Перебування на відстані 2,0 та менше метрів від пацієнта з підозрою чи підтвердженою COVID-19 протягом 1-2 хв**
- 2. Незахищений прямий контакт з пацієнтом і/або його біологічними рідинами або забрудненими речами пацієнта**
- 3. Прямий контакт з пацієнтом і/або його біологічними рідинами з використанням ЗІЗ не належного рівня**
- 4. Прямий контакт з ЗІЗ, що забруднені біологічними рідинами пацієнта з підтвердженням COVID-19**

# Тривалий вплив

- 1. Чітких даних не має**
- 2. Слід розуміти під терміном «тривалий вплив» час, що перевищує 1-2 хв.**
- 3. Час контакту може не враховуватись за умови наявності у пацієнта постійного кашлю та перебування працівників системи ЕМД у безпосередній близькості від нього**



# Можливі варіанти ризику

**Високий**

**Середній**

**Низький**

# Високий ризик

1. Тісний контакт без використання засобів захисту верхніх дихальних шляхів
2. Перебування у приміщенні без належних ЗІЗ (відсутній захист очей, рота, носа) при проведенні пацієнтам АІМ

# Середній ризик

- 1. Тісний контакт в засобах захисту дихальних шляхів з пацієнтами із COVID-19, які були без засобів захисту дихальних шляхів**

# Низький ризик

- 1. Короткі або тривалі, тісні контакти працівників (за умови використання ними лицьової маски або респіратора) з пацієнтами, які використовували лицьові маски.**

Епідеміологічні фактори ризику	Ризик	Рекомендований моніторинг	Обмеження в роботі для працівників без ознак хвороби
--------------------------------	-------	---------------------------	--

## 1. Тривалий тісний контакт з пацієнтом, який **НОСИВ** маску для обличчя

1.1. Працівники без жодного ЗІЗ	середній	активний/ самоконтроль	терміном на 14 днів
1.2. Працівники в ЗІЗ: без маски чи респіратора	середній	активний/ самоконтроль	терміном на 14 днів
1.3. Працівник в ЗІЗ: без захисту очей	низький	активний /самоконтроль	не потрібно
1.4. Працівник в ЗІЗ: без халату чи рукавичок <sup>1</sup>	низький	активний /самоконтроль	не потрібно
1.5. Працівник в ЗІЗ: носить всі рекомендовані засоби індивідуального захисту (за виключенням носіння маски для обличчя замість респіратора)	низький	самоконтроль	не потрібно

Епідеміологічні фактори ризику	Ризик	Рекомендований моніторинг	Обмеження в роботі для працівників без ознак хвороби
--------------------------------	-------	---------------------------	--

## 2. Тривалий тісний контакт з пацієнтом, який **НЕ НОСИВ** маску для обличчя

2.1. Працівники без жодного ЗІЗ	високий	активний	терміном на 14 днів
2.2. Працівники в ЗІЗ: без маски чи респіратора	високий	активний	терміном на 14 днів
2.3. Працівник в ЗІЗ: без захисту очей	середній	активний	терміном на 14 днів
2.4. Працівник в ЗІЗ: без халату чи рукавичок	низький	самоконтроль	не потрібно
2.5. Працівник в ЗІЗ: носить всі рекомендовані засоби індивідуального захисту (за виключенням носіння маски для обличчя замість респіратора)	низький	самоконтроль	не потрібно



**Питання**